

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская
клиническая поликлиника № 2»
163002 г. Архангельск, пр. Ленинский, 42, т. 59-39-35

Бареховой Анастасии Александровны

Дата рождения 02.09.2014 г.,

проживающей по адресу: г.

Архангельск,

Клинический диагноз:

Тяжелое перинатальное поражение гипоксически-ишемического, инфекционного генеза, мультикистозная дегенерация, смешанная атрофическая гидроцефалия, синдром ДЦП, смешанный правосторонний гемипарез и атонически-астатическая. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Грубая задержка ПМР.

Частичная атрофия зрительных нервов. Сложный миопический астигматизм. Вторичное расходящееся косоглазие OU.

Анамнез заболевания

Ребёнок от 1 беременности на фоне ОГА, хронической фетоплацентарной недостаточности. Роды 1 в 41 неделю, оперативные, масса 2995, длина 51 см, окружность головы 33,5 см, груди 32 см. ОА 1/3/3/4/45. При рождении состояние очень тяжелое, кома, ДН. Находилась в отделении новорожденных Архангельской детской областной больницы с диагнозом: врожденная пневмония двусторонняя, церебральная ишемия 2 ст., судорожный синдром.

В 2 месяца на НСГ обширные кистозно-дегенеративные изменения в ПВЗ и субкортикальных зонах. ЭЭГ в 3 мес. - задержка созревания возрастной биоэлектрической активности, не исключается эпилептиформная активность. Получала актовегин, глиатилин, пантогам. Осмотр окулиста в возрасте 4 мес. - миопический астигматизм OU, не исключается ЧАЗН слева. Осмотрена сурдологом - без патологии. В возрасте 5,5 месяцев - клонические подергивания правой стопы и кисти, на ЭЭГ - эпи-подобная активность в левых лобно-теменных отделах. Назначена противосудорожная терапия - кеппра, затем дополнительно конвулекс-сироп.

В возрасте 9 месяцев вновь осмотрена окулистом, диагноз - сложный миопический астигматизм обоих глаз, расходящееся косоглазие OD, ЧАЗН. В декабре 2015г. выписаны очки для постоянного ношения.

В сентябре 2015г. на ЭЭГ - региональная эпилептиформная активность в передней, средневисочной области справа, в октябре 2015г. переведена с конвулекса на кеппру. Получила курс мексидола, церебрума композитума. Дважды - курсы реабилитации в Чехии, курс реабилитации в Санкт-Петербурге.

Последняя госпитализация - июнь 2016г. в ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Осмотрена окулистом: поражение зрительных проводящих путей, косоглазие

альтернирующее ОУ. Миопический астигматизм. На ЭЭГ – эпилептиформная активность по центрально-височно-теменным отведениям слева и справа.

МРТ головного мозга 23.06.2016г. Полушария головного мозга симметричны. Ваулизируются кистозно-глиозные изменения в лобно-височных, теменных и затылочных долях. Кора атрофична, сглажена. Признаки внутренней гидроцефалии.

Гастроэнтеролог 22.06.2016г. Дисфункция билиарного тракта. Функциональный запор.

Генетик 22.06.2016г. Выраженная задержка ПМР. Микроцефалия. Симптоматическая эпилепсия.

Невролог-эпилептолог 17.05.2018г. Диагноз тот же. Продолжить прием кеппра 2,4 мл. 2 раза в день, курсы реабилитации (ЛФК, массаж, Войта-терапия, аппаратное лечение)

Ортопед 19.01.2018 г. Вальгусная деформация шеек бедренных костей.

Профпрививки – медотвод постоянно.

18.05.2018г.

Зав. детским отделением

И.Р. Двуглазова.

