



Общество с ограниченной ответственностью
Детский реабилитационный центр «Шаг вперед. Томск»
ОГРН 1167031052880, ИНН 7017395737
Юр. адрес: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 212 а, 12
Фактический адрес: г. Томск, ул. Пушкина, 63
Реквизиты: Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 45004774, р/с 40702810623010000765, к/с
40702810623010000765

19.08.2020 г.

Осмотр врача-невролога

Дубровская Виктория Романовна 13.12.2013 г.р.

Жалобы: не ходит самостоятельно, тонус усилился в последнее время, косит глаз

слева

Анамнез: с анамнезом ознакомлена.

Осмотр офтальмолога от 19.02.2020 г.р. – УКУ -0*

Неврологический статус: ЧМН – очаговой симптоматики нет, слежение хорошее. Язык по средней линии. На момент осмотра стробизма не вижу, издали становится заметно расходящееся косоглазие слева, без ограничения движения глазных яблок. Мышечный тонус спастичен, грубее в руках, больше слева. Сухожильные рефлексы оживлены с двух сторон. Определяются подошвенные патологические знаки с двух сторон. Моторика с отставанием по возрасту. Сидит с опорой или в положении «W» - образно, ползает на четвереньках, не перекрестно, подтягиваясь поочередно руками и ногами, опора только на правую руку. Опора сразу на носки, потом идёт опускание на пятки, но с усилением положения «тройного сгибания». Разгибание в коленном суставе затруднено. Мышечная сила с рук 4б. Речь фразовая, сформирована по возрасту, брадилалия. Эмоциональный фон положительный. Навыки самообслуживания сформированы частично, функцию органов таза контролирует хорошо.

Заключение: Органическое поражение ЦНС, ДЦП, спастическая диплегия, GMFCS III, FMS -C -1-1, CFCS I. MACS 4. Остаточные проявления дизартрии, контрактуры коленных суставов, вальгусная деформация стоп. Альтернирующее расходящееся косоглазие.

Рекомендации:

1. Тьютора на коленные суставы на ночь и динамические ортезы для ходьбы (постепенно увеличивая время ношения).
2. Ботулинотерапия (Диспорт) в м\рук, м\ног (полуперепончатую, полусухожильные)
3. Через 2 мес после ботулинотерапии:
МагнеВ6 по 1 ампулу утром и 1/2 ампулы вечером, в еде (разбавляя в жидк) – 1,5 мес,
Затем:
Сирдалуд 2 мг по 1/4 таб вечером – 5 дней,
затем по 1/2 таб вечером – 5 дней,
затем по 1/4 таб утром и 1/2 таб вечером – 1,5 мес,
затем по 1/4 таб утром и вечером – 1 нед,
Затем по 1/4 таб утром – 1 нед и отменить
Через 1 мес;
МагнеВ6 – по той же схеме -1,5 мес,
Затем:
Сирдалуд – по той же схеме
И т.д.
4. Томатис- терапия 1 раз в 6-8 мес.

