

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
имени Г.И. ТУРНЕРА» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГУ «НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА» Минздрава России)

196603, г. Пушкин  
Парковая, 64-68

Поликлиническое отделение:  
тел. 465-49-95; факс 465-59-28

## Выписная справка

**Пациент:** Фаустов Иван

**Возраст:** 07.10.2011

**Место жительства:** г. Елец

**Дата поступления:** 06.12.2019

**Дата выписки:** 16.12.2019

**Диагноз при поступлении:** ДЦП. Спастическая диплегия. Плано-вальгусная деформация стоп. (G80.1)

**Диагноз при выписке:** ДЦП. Спастическая диплегия. Состояние после хирургического лечения.

**Сопутствующие заболевания:** симптоматическая эпилепсия

**Жалобы при поступлении:** нарушение походки, деформация стоп

**Анамнез:** по поводу основного заболевания получал консервативное медикаментозное и реабилитационное лечение.

Оперирован в 2016 г. по методике Ульзибата (множественные фибротомии)

Оперативное лечение на 5 отделении инст.Турнера

05.05.2017 г – с двух сторон: селективная невротомия запирающего нерва, ахиллпластика с задней капсулотомией г/с и подтаранного суставов, фиксация подтаранного сустава спицей Киршнера.

**Ортопедический статус:** Передвигается спастической походкой без опоры нагружая внутренние отделы стоп. Ортопедическое состояние нижних конечностей:

- Т/б суставы: контрактур нет
- Коленные суставы: разгибание полное
- Г/с суставы: контрактур нет
- Форма стоп: плано-вальгусные деформации стоп, мобильные

**Результаты обследования при поступлении:**

Лабораторные показатели крови и мочи без патологических изменений. ЭКГ в норме

**Оперативное лечение:**

11.12.2019 г – операция Грайса с двух сторон, операция Страйера с двух сторон.

Иммобилизация циркулярными короткими гипсовыми повязками.

Послеоперационный период протекал гладко. Гипсовые повязки стабильны.

Нейроциркуляторных нарушений нет. Карантина на отделении нет. Выписывается в стабильном состоянии под наблюдение хирурга по месту жительства.

### Рекомендации:

- Наблюдение у хирурга по месту проживания
- Следить за состоянием гипсовой повязки, отсутствие осевой нагрузки
- ЛФК на верхние конечности постоянно
- Укладки на разгибание в коленных суставах и разведение в т/б суставах при среднем ротационном положении бедра
- Произвести смену гипсовых повязок и удалить спицы Киршнера через 4 недели со дня операции
- Явка в протезную мастерскую института для снятия гипсовых повязок, контрольной Rg стоп, изготовления ш/к аппаратов на г/с сустав через 2 месяца со дня операции
- В периоде реабилитации ребенок будет нуждаться в изготовлении/приобретении опоры для стояния и сидения, аппарата на туловище и нижние конечности, аппарата на т/б суставы, тугоров на нижние конечности (на коленные и г/с суставы), аппаратов на г/с суставы (2 шт), ортопедической обуви, подунков-ролаторов и многоопорных тростей.

Леч.врач:  
Зав. отделения:

/Новиков В.А./  
/Никитина Н.В./

