

ОГАУЗ "Областная детская
больница"

634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 44
Телефон: (3822) 909-767

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
НЕВРОЛОГ

Амбулаторно-
поликлиническое

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

02.07.2019 11:04

ФИО: Гуртяков Виктор Романович Дата рождения: 02.03.2012

Адрес регистрации: 634000, обл. Томская, г. Томск,

Адрес фактический: обл. Томская, г. Томск,

Жалобы при обращении: Самочувствие удовлетворительное. Ходит с поддержкой за 2 руки, сидит самостоятельно, играет игрушками, перекладывает из руки в руку, на фоне прорезывания зубов - иногда кричит. Сон спокойный, приступов нет с 10 июня, речь - появились слоги. Не контролирует физиологические отправления. В настоящее время получает противосудорожную политерапию: Депакин-хроносфера 750мг, Кеппра сироп 1700 мг, Топамакс 75 мг и Сабрил 2500 мг в сутки (с 12.2018).

Анамнез: Наблюдается в Красноярске - Криптогенная генерализованная эпилепсия с частыми асимметричными аксиальными и аксоризомиелическими приступами, окулотоническими приступами, трансформация из криптогенного синдрома Веста в криптогенный синдром Леннокса-Гасто, фармакорезистентность. ЭЭГ 11.15г - признаки нейрофизиологической незрелости коры. В состоянии бодрствования зарегистрирована эпилептиформная острая-медленная волна в лобно-вис области справа с генерализацией, диффузные вспышки пик-полипик- преобладанием по височным отведениям до 70-80% во сне. МРТ головного мозга - Очаговых изменений нет, смешанная наружная заместительная гидроцефалия. Генетик - Патологии не выявлено

Получал курс октагама с 11.15г по схеме - отмечается улучшение. С 12.2017 по 28.11.18 - курс гидрокортизона. После окончания курса отмечалось учащение спазмов. В лечении в г. Красноярске добавлен Сабрил 2000мг в сутки. В настоящее время - сабрил повысили до 2500 в сутки, снижают ккепру и топамакс, Биох. анализ от апреля 2019 (со слов мамы) - бл. ЭЭГ от июня 2019 (представлена на телефоне) - зарегистрированы генерализованные приступы. Рекомендовано - проверить концентрацию вальпроевой кислоты в крови.

Объективный статус: Состояние тяжелое по заболеванию. Масса тела 25 кг. Реагирует на звук. бращенную речь не понимает, инструкции не выполняет, речь - гуление. Голову держит, сидит сам. Спину при сидении держит. ЧН - объем глазодвижений полный, следит неустойчиво. Расходящееся косоглазие справа. Зрачки равные. Нистагм нет. Лицо симметричное. Глотание не нарушено. Объем движений ограничен в правом глст суставе, Тонус мышц диффузно снижен. Проприорефлексы - верхние конечности живые, нижние конечности - коленные высокие, равные, ахиллов слева высокий с клонусом стопы, справа снижен (ретракция сухожилия). Симптом Бабинского (+) с обеих сторон, более выражено справа. Опора вальгусная, при поддержке шаговые движения спастические. В подгузнике.

Диагноз: G40.5 Эпилепсия симптоматическая. Эпилептическая энцефалопатия. Электрический эпилептический статус в фазу медленного сна (из синдрома Веста) Фармакорезистентность

Рекомендации: Вальпроевая кислота пролонгированная в гранулах (Депакин хроносфера) 200мг утром и 500 мг вечером - постоянно (28 мг.кг.с) Не заменять препарат на дженерики, из - за опасности возникновения нежелательной побочной реакции

Топирамат (Топамакс) 20 мг утром и 50 мг вечером - постоянно, снижение дозы 1 раз в 3 нед, по 25 мг
Леветирацетам раствор (Кеппра, Леветинол) 700 мг утром и 700 мг вечером - снижение по 100 мг 1 раз в неделю,

Вигабатрин (Сабрил) 1000мг утром и 1500мг вечером - постоянно

Фризиум - 30 мг на ночь, инавелон - 150 мг утром, 200 мг вечером,

проверить концентрацию вальпроевой кислоты в крови (не принимать пищу за 2 часа)

ОАК с ТР, ОАМ, блх крови (печеночные пробы) - 1раз в 6 мес.

ЛФК Массаж общий курсами 3-4 раза в год

Ортопедическая обувь. опора для вертикализации, аппараты на нижние конечности, тьютора на нижние конечности - позиционная терапия.

Абсорбирующее белье.

Наблюдение невролога, окулиста, психиатра, ортопеда, эндокринолога 1 раз в 3 - 6 мес;

МРТ головного мозга (результат), ЭЭГ (результат).

повторный осмотр невролога через 3 мес по направлению.