

CORTEX



ООО Медицинский центр «CORTEX»

Юридический адрес: 156852, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, офис 147.
Неврологическое отделение: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе 44
Тел.: 8-(495)-407-05-21, 8-(928)-206-25-26, e-mail: cortex-msk@mail.ru
Лицензия № ЛО-23—1-007933 от 24.11.2014г.

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

ФИО: Лозовой Артем Вадимович

Д.р. (возраст): 10.06.2008г (9л)

Место регистрации: Республика Казахстан, г. Павлодар,

Дата поступления: 21.07.2017г

Дата выписки: 04.08.2017г

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:

Резидуально-органическое поражение ЦНС, задержка психо-речевого развития с интеллектуальными и эмоционально-волевыми нарушениями, сочетанная с симптоматикой аутистического спектра.

Жалобы:

на задержку психо-речевого развития (несформированность активной фразовой речи), нарушена взаимная коммуникация и социальная адаптация во внешних условиях, ограниченность интересов.

Неврологический статус:

В зрительный контакт вступает. К предложенным стимулам интерес предъявляет сразу. Не усидчив, постоянно отвлекается. Отмечается недостаточно устойчивый уровень внимания, истощается, требует переключения на другой вид деятельности. Создает зрительный контакт при разговоре.

Понимает обращенную речь, усваивает сложные инструкции. Процессы анализ и синтеза мыслительной деятельности снижены. Реакция на одобрение и замечание присутствует.

Эмоциональные проявления лабильны. Дифференцирует базовые эмоциональные состояния, и может соотнести их с социальными ситуациями.

Навыками самообслуживания владеет.

ЧМН: III IV VI пары: Глазные щели: равны, птоза нет. Объем движений глазных яблок не ограничен. VII пара: лицевая мускулатура симметричная, гиперкинезы лица отсутствуют. VIII: Нистагма нет. IX X пары: Дисфагии нет. Гиперсаливации нет. Дизартрии нет, подвижность артикуляционного аппарата не нарушено. XI пара: Положение головы по средней линии. Поворот головы не ограничен. XII пара: Язык по средней линии, подвижный, атрофий и фибрилляций не выявлено.

РДС: Двигательная активность не изменена. Мышечный тонус физиологичен, D=S. Сухожильные и периостальные рефлексы живые, симметричные. Патологических стопных рефлексов не выявлено, рефлексы орального автоматизма отсутствуют.

Проведенные лабораторные/инструментальные исследования, консультации:

Наименование исследования/консультации	Дата	Результат исследования
Электроэнцефалография	21.07.2017г	При проведении ЭЭГ в состоянии бодрствования выявляется дезорганизация биоэлектрической активности головного мозга. Представленность и частота доминирующего коркового ритма по возрасту. Значимой межполушарной асимметрии и признаков регионального замедления не выявлено. Эпилептиформно йи другой пароксизмальной активности нет.

Пациенту проведены следующие виды лечения:

1. Биофизическая активация нейрональных структур по схеме «ЗППР для детей 8-14 лет» №10
2. Эндоназальный электрофорез с нейротропным препаратом (кортексином) №10
3. Лимфомежклеточная терапия №5

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Наблюдение невролога
2. Индивидуальные и групповые занятия с логопедом-дефектологом, педагогом-психологом;
3. Контроль ЭЭГ через 6 мес;
4. Повторный курс лечения в мц CORTEX через 6 месяцев.
5. Курс инъекционного лечения препаратом (осень-зима) «Моносиаловый ганглиозид» (2мл/20мг) — внутримышечно ежедневно по 2,0 мл. Курс — 20 инъекций.
6. **Efalex Brain Formula** или **Esprico** по 1 капсуле 2 раза в день. Курс 120 дней. (www.SeiGesund.ru)

7. 1 КУРС:

- ✓ - **Ноопепт** (в 1 таб 10мг) по ¼ таб. 2 раза в день (утром и в 17.00), при нормальной переносимости возможен прием препарат утром ½ таб, в 17.00 — ½ таб. Курс 1,5мес.
- ✓ - **Винпоцетин** (в 1 таб 5мг) по ¼ таб. 3 раза в день. Курс 1,5 мес.

2 КУРС (через 2 недели после окончания ноопепта):

- ✓ - **Церебро** - в/м (в 1 ампуле 1000 мг-4мл) по 4 мл через день. Курс — 10 инъекций. Затем после окончания инъекций препарат необходимо принимать в капсулах — по 1 капсуле (400мг) 1 раз в день в течение 4 недель.
- после окончания инъекций также к лечению необходимо добавить **GABA** (250мг в 1 таб) — по 1 таб утром в течение 5 дней, затем по 1 таб 2 раза в день (утром и в 17.00). При нормальной переносимости препарата через пять дней дозировку необходимо увеличить до 2 таб. 2 раза в день. Общая продолжительность курса лечения — 1,5-2 месяца.

Зав.отделением

Врач-невролог, нейрофизиолог:

Главный врач МЦ CORTEX:

Пичугов Д.Г.

Лукиша Л.В.

