



продолжить прием Амикацин 500 мг 1 раз в день №7 с последующим ОАМ + бак посев в поликлинике по месту жительства.; Профилактика тромбозов - под контролем УЗИ сосудов ног

2. Активизация - смена положения тела, присаживать;

3. Амбулаторно - Берлитион 600 мг в сутки 2 недели + Цитофлавин по 2 табл 2 раза в день 4 недели; При болях - При болях Аркоксиа, Нимесулид, Ацеклагин. Пройти курс препаратом Галавит. Препараты железа (Ферум лек, Мальтофер)

4. Наблюдение невролога; Необходимо проведение восстановительного стационарного лечения не реже 2-3 раз в год - ЛФК, массаж, физиолечение, ИРТ, сосудистая и ноотропная терапия (трентал, цитофлавин, пирацетам, нейромидин, актовегин);

5. МСЭК по месту жительства; Постоянно нуждается в посторонней помощи, нуждается в обеспечении средствами реабилитации - одноразовые лубрицированные катетеры, впитывающие простыни, противопролежневый матрас, кресло-каталка;

6. КТ ПОП через 6 месяцев, осмотр нейрохирурга с результатом.

осмотр с результатом в Университетской клинике ПИМУ по предварительной записи. тел. call-центр +7(831)422-13-30

За время нахождения на стационарном лечении в контакте с инфекционными больными, в том числе больными новой коронавирусной инфекцией не была.

Подпись лечащего врача:

 / Братцев И.С. 17.05.2022

Подпись заведующего отделением:

 / Бокон А. Е. /

