

РЕНТГЕН

Реабилитация

Проведенное лечение: Фитотерапия, 20 дней. ИРТ, 11 дней. ЛФК, 28 дней. Физиотерапия, 20 дней. (биостим на переднюю поверхность бедер с 31.05.23 г. по 14.06.23 г., ультразвук на коленные суставы с 15.06.23 г. по 27.06.23 г.) Грязелечение, 20 дней. (грязи на коленные, голеностопные суставы чередовать) Массаж, 21 дней. (нижних конечностей, поясничного отдела позвоночника чередовать) Солевая пещера, 20 дней. Кислородный коктейль, 20 дней.

Медикаментозное лечение:

Диклофенак 1 %, в дозировке на 1 прием - 1.00, 2 раз/день, в течении 9 дн., наружно на левый коленный сустав.; Димексид 25 %, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 5 дн., компресс на левый коленный сустав: р-р димексида 1:1 с водой на 30 мин.; Монурал 3 г, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 1 дн., за 2-3 часа после еды.; Октолипен 300 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 28 дн.

Полученные результаты после прохождения реабилитации:

Оценка по шкалам:

Оценка по шкалам: Индекс мобильности Ривермид 46; ШРМ 46; по шкале FIM Двигательные - 476/Когнитивные - 356/Сумма - 82 б.; спастичность 16 по Эшфорт;

При выписке:

Общее состояние - удовлетворительное, сознание - ясное ЧМН: I пара: без патологий. II пара: без патологий. V пара: Мандибулярный рефлекс: оживлен. VII пара: без патологий. VIII пара: без патологий. IX пара: без патологий. X пара: без патологий. XI пара: без патологий. XII пара: без патологий. Афазия - нет, глотание - не нарушено, фонация - не нарушена. Сила в конечностях: в проксимальных отделах верхних конечностей - D - 5.00б, S - 5.00б, в дистальных отделах верхних конечностей - D - 5.00б, S - 5.00б, в проксимальных отделах нижних конечностей - D - 1.00б, S - 1.00б, в дистальных отделах нижних конечностей - D - 0.00б, S - 0.00б. Чувствительность: анестезия с уровня D12. Тонус мышц: пирамидный, D = S. Походка - передвигается до 15 м с опорой на 2 многоопорные трости с фиксированными коленными суставами. Костно-суставная система: без патологий Координаторные пробы: поза Ромберга - устойчив, ПНП - выполняет ПКП - не выполняет с обеих сторон. Функция тазовых органов: мочеиспускание-катетеризация 6 раз в сутки, стул-запоры

В результате лечения: улучшение баланса, незначительное увеличение мышечной силы, передвигается в брусках с фиксированными коленными суставами, с опорой на 2 многоопорные трости с фиксированными коленными суставами 15 м

Рекомендации пациенту:

- продолжить занятия ЛФК
 - наблюдение невролога по месту жительства
 - Курсы уросептиков при бактериурии- Монурал, нитроксолин, фурагин.
 - таб. Нейромидин 20 мг 2р в день 1мес - 3 курса в год
 - Вит гр В -мильгамма (комбилипен) 2.0 мл в/м 1 раз в день №10 2 курса в год
 - Повторные курсы реабилитации
- За время нахождения в ООО "С-П "Янтарь" в контакте с инфекционными больными, в т.ч. с Covid-19 не находился.

Врач:

Залетова И. А.

Главный врач:

Васильев В.В.

