



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ
«ОХМАТДИТ»

Відділення ургентної хірургії з ліжками нейрохірургії

1135, м. Київ,
вул. Чорновола, 28/1

тел: 236-41-84

Выписка № 1025

із медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого.

Сирота М.О., 6р (02.05.12) знаходилась в відділенні ургентної хірургії з 14.08.18 по 27.08.18.

Діагноз: Загострення хронічного пієлонефрита. Спінальний сечовий міхур. Ішурія парадокса. Стан після множинних оперативних втручань. Аугментація сечового міхура сегментом сигмовидної кишки. Стан після нефректомії справа (лапароскопічно).

Дитина поступила о 10.40 14.08.18 з болями в животі, багаторазову блювоту. Рентгенографія ОЧП(14.08.18): пневматизація кишківника рівномірна у всіх відділах. Вільного газу та рідини не визначається. Рентгенологічних ознак кишкової непрохідності не визначається. УЗД ОЧП(14-15.08.18) додається.

Общий анализ крови													
	WBC	R	B	Hb	Ht	PLT	СОЭ	КВС	Э	П	С	Л	М
	8.8	5.0	128	38	439	20			1	15	34	45	4
Биохимический анализ крови													
	Глюк	Белок	Билирубин	ТимоЛовая	АлАТ	АсАТ	Щелочная	Аамилаза	Креатинин	Мочевина			
	4.8	67	3.2		19	44	76	108	48	5.2			


Заг.ан.сечі: колір - св.ж; пит.вага - 1010; р-ція - 6.5; білок - сліди; Л - 12-26 в п/з; Ер - покр.все поле зору;епітелій перехідн; слиз - скудно.

В задовільному стані виписується на амбулаторне лікування за місцем проживання в районній поліклініці або в профільному стаціонарі за місцем проживання. Епід отечення в нормі.

Рекомендовано:

1. Спостереження нефролога за місцем проживання в районні поліклініці.
2. Дієта № 5 - 12 місяців.
3. Фуромаг по 50мг Зр/д протягом 10 днів потім по 25мг Зр/д профілактична доза.
4. Постійна катетеризація сечового міхура з дотриманням індивідуальної гігієни.

Лік.лікар



Жежера Р.В.

Зав.відділенням

Гришин О.О.