



ООО «Профессиональный медицинский центр»

«Клиника педиатрии и детской хирургии»

ГРН 1447746267272 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корпус 2.

Тел.: +7(495) 303-00-00

Ирина Иванова
Allyn SureSight
Age: 16.00 Sex: F Eye: BR SW: 2.25
S: +0.75 C: -0.50 A: 169
Adult (17 & over)
Name: _____
Date: _____ SW: 2.25

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА

Ребенок **Солдатова Ангелина**, возраст – 16 лет, находился на обследовании 13.07.2019

Анамнез – Роды в срок. Наблюдается у невролога по поводу ДЦП. Косоглазие с раннего возраста, лечение не проводилось. Ребенок, говорит, что последнее время стало плохо видно.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ОСМОТР.

Правый глаз Рефракция = -1,0-0,25 169, скиаскопия -0,5/_Ем ВГД пальпаторно в норме после мидриаза Рефракция авто 0,0\ -0,25\142, скиаскопия Ем
Visus = 0,9 н/к (буквы). Веки не изменены. Глазная щель обычная; слезные точки не изменены. Положение в глазной щели неправильное — dev. diverg -15-20 град по Гиршбергу, альтернирует; подвижность глаза не ограничена, конвергенция снижена. Конъюнктивa: чистая, спокойная, блестящая. Роговица: прозрачная. Передняя камера: средней глубины. Радужная оболочка: не изменена. Зрачок округлый, 3мм, реакция на свет в норме, расширяется до 7 мм; Хрусталик: прозрачный. Стекловидное тело прозрачное. Глазное дно: диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие, сосуды не изменены, макулярная зона – рефлекс макулярный оформлен, фовеолярный нечетко просматривается, сетчатка на периферии не изменена.

Левый глаз Рефракция = +0,75-0,5 35 скиаскопия +0,5/+0,75 ВГД пальпаторно в норме после мидриаза Рефракция авто +1,25\ -1,5\32 скиаскопия Ем\ +1,5
Visus = 0,8-0,9 н/к (буквы), отвечает с поворотом головы вправо. Веки не изменены. Глазная щель обычная; слезные точки не изменены. Положение в глазной щели неправильное — dev. diverg -15-20 град по Гиршбергу, с гипертропией до 5 град, альтернирует; подвижность глаза не ограничена, конвергенция отсутствует. Конъюнктивa: чистая, спокойная, блестящая. Роговица: прозрачная. Передняя камера: средней глубины. Радужная оболочка: не изменена. Зрачок округлый, 3мм, реакция на свет в норме, расширяется до 7 мм; Хрусталик: прозрачный. Стекловидное тело прозрачное. Глазное дно: диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие, сосуды не изменены, макулярная зона – рефлекс макулярный оформлен, фовеолярный нечетко просматривается, сетчатка на периферии не изменена.

Цветотест – монокулярное, альтернирующее зрение с 1 м и с 3 м

ДИАГНОЗ.

OU – Постоянное расходящееся содружественное альтернирующее косоглазие, не аккомодационное. OS – Гиперметропический астигматизм слабой степени.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Учитывая большую величину и постоянный характер угла косоглазия, отсутствие конвергенции, монокулярный, альтернирующий характер зрения, ребенку показано проведение оперативного лечения косоглазия с целью стабилизации глаз в ортопозиции (желательно - рецессия с резекцией).

Исключение близких электронных зрительных нагрузок.

Тренировка зрения на поиске дальних предметов.

Контрольный осмотр после хирургического лечения.

Врач-офтальмолог, к.м.н. -

(Скрипец П.П.)