

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Детская городская
клиническая поликлиника №1»
454080, г. Челябинск, ул. Коммуны 125
т. (351) 79-97-07

Главный детский невролог города Челябинска

Заслуженный врач РФ

д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ЮУГМУ

Эксперт Национальной ассоциации по проблемам

Церебрального паралича и сопряженных заболеваний

Плеханов Леонид Александрович

Консультативный прием

ФИО: Суслин Матвей Константинович, 01.07.2008 г.р.

Адрес: 454087, обл. Челябинская, г. Челябинск,

Место приема: В поликлинике

Жалобы при обращении: Жалобы на то, что ребенок не ходит сам.

Анамнез:

Ребенок от 1 беременности на фоне УПБ 1 половины, роды 1, преждевременные, на сроке 7 месяцев после род дома переведен в ОПН. В возрасте 1 месяц перенес правостороннюю аспирационную сегментарную пневмонию, ДН II, ИВЛ. Отставал в психомоторном и речевом развитии. 16.02.2009 проконсультирован главным детским неврологом города д.м.н., профессором Плехановым Л.А. выставлен DS: ДЦП, спастический тетрапарез, средней степени тяжести. ЧАЗН обоих глаз. С-м Веста. Даны рекомендации по лечению и оформлению инвалидности.

Направляется на МСЭК для переоформления инвалидности

Осмотр: ∴. Nst; ЧН: взгляд не фиксирует, только светоощущение и слабо дифференцированная фиксация объектов на расстоянии около 20 см. Энофтальм, эпикант. Реакция зрачков на свет прямая и содружественная ослаблены. Усиление ментального рефлекса. Сходящие альтернирующее косоглазие.. Язык по средней линии, в преимущественном положении у верхнего неба. «спастичный», саливация усилена.

Сухожильные рефлексы гиперфлексия S=D

Мышечный тонус гипертонус S=D Патологический тонус по шкале спастичности Эшуорта 3 балла. Не ходит самостоятельно. Сидит сам, спускает с кушетки, опора на ноги с преимущественной опорой на носки, эквино – варусное положение в г) суставах, аддукторная

«спастичность» в бедрах. При вертикализации сохраняется патологическая «поза тройного сгибания».

Обращенную речь понимает, инструкции выполняет, говорит.

Диагноз: G80.8 Синдром ДЦП, Спастическая диплегия. GMFCS 3 level, Амблиопия

Рекомендации:

1. ЛФК, физиотерапия-лазеротерапия.
2. Постепенное снижение дозы препарата депакин, учитывая ЭЭГ и токсическое содержание в крови вальпроевой кислоты, до 15мг\кгсут, в течение месяца до 10мг\кгсут, с последующей отменой. При возобновлении приступов коррекция противосудорожного препарата.
3. Вопрос о вакцинации против гриппа решить с иммунологом.



20.06.2020
Плеханов Л.А.

Тереженко
Гантус
Фонд К.Б. Добродель
Медведева К.Б.
Мед