

ВЫПИСКА

**из истории развития Васильева Глеба Дмитриевича 08.05.2012 г.р.,
проживающего по адресу Стерлитамакский район,**

Ребенок от I беременности, от срочных родов в 32 недели в предлежании в переднем виде. По Апгар 3-6 баллов. Вес при рождении 2060 гр., длина 44 см, о.гол. 31 см, о.гр. 27 см.

Диагноз при рождении: асфиксия тяжелой степени, синдром дыхательных расстройств, церебральная ишемия II степени с судорожным синдромом, пневмония.

10 мая 2012 года в возрасте 2—х суток переведен в ОПН РДКБ

Консультирован неврологом: ЦН 2 степени, судорожный синдром.

Окулист: ангиоретинопатия недоношенных.

Лечение: инфузион.терапия, антибактериальная терапия, ИВЛ, электрофорез платифиллина, УВЧ грудной клетки.

В 3 месяца ребенок осмотрен неврологом с жалобами на закатывания при плаче. Диагноз: последствие гипоксии, поражение ЦНС, синдром тонусных нарушений, гипервозбудимости. Рекомендовано: Пантогам, общий массаж, микстуры с цитралью.

11.09.2012 г. в 4 месяца осмотрен педиатром РДКБ, неврологом. Диагноз: последствие перинатального поражения ЦНС, восстановительный период, синдром двигательных нарушений. Угроза по ДЦП.

УЗИ головного мозга от 11.09.2012 г.: эхо картина соответствует последствиям гипоксически-ишемического поражения головного мозга, перивентрикулярная лейкомаляция в стадии кистозной дегенерации слева.

Рекомендации: ЛФК, общий массаж, глицин, пикамилон, реабилитация в ДЦГНиЭ, мед.отвод от прививок.

Повторный осмотр невролога в ноябре 2012 года в РДКБ.

Рекомендации: ЛФК, парафино-озокеритные сапожки, Церебролизин №10, затем Танакан, Пантогам.

19.01.13 – осмотр невролога: сидит неустойчиво, недолго, к игрушкам не тянется, голову держит с 6 месяцев.

Диагноз: последствия гипоксического поражения ЦНС, синдром тонусных нарушений, гидроцефальный синдром, задержка психомоторного развития.

Рекомендации: ЛФК, электростимуляция мышц спины, рук №10.

02.02.13 г. Осмотрен окулистом – ангиопатия сетчатки.

27.02.13 г. НСТ – желудоч. система расширена: правый боковой желудочек – 12 мм, левый – 16 мм, третий – 9 мм. Межполушарная щель расширена до 10 мм. Подбололочные пространства лобных долей расширено до 7-9 мм. На фоне лечения незначительная положительная динамика.

19.03.13 г. – осмотрен неврологом, стал удерживать голову, недолго сидит с опорой, игрушки может удерживать в ручках, но не тянется к ним, стал спокойнее, лепечет, эмоции выражает.

В VII/13 оформлена инвалидность. Получает лечение у невролога по месту жительства. Ежемесячно проходит курс массажа и ЛФК.

Стационарное лечение в Научно-терапевтическом центре по профилактике и лечению психоневр. инвалидности с 01.12.14 по 10.12.14.

Заключение психолога: задержка психоречевого развития. Пассивный словарь. Отмечается слюноотделение. КТ мозга - перивентрикулярная лейкомаляция с гипоплазией передних отделов лобных, теменных, височных долей, выражена гипоплазия мозолистого тела, ствола мозга. Корневая дисплазия, вентрикуломегалия.

С 2015 года по сегодняшний день проходит лечение в санатории НУР г.Стерлитамак, в реабилитационном центре с.Наумовка и в реабилитационном центре «Сакура» г.Челябинск, ФГПУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П.Глинки», детский центр абилитации «Родник».

Наблюдается и проходит лечение у невролога Агапова О.С. в г.Уфе.

28.02.18

