

**"ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

350007, г.Краснодар, ул.пл.Победы,1

тел.68-02-37, факс (8612) 68-28-26

E-mail: kkdcb@mail.kubtelecom.ru

ОКПО 02800816

Неврологическое отделение

Тел 268-16-51

Веренцова Юлия 3года4мес. (вес 17кг).

Осмотрена неврологом.

Сохраняются жалобы на двигательные нарушения- ходит с поддержкой, может стоять у опоры, элементы фланговой ходьбы, вздрагивания при резких звуках.

Эмоциональна, тревожна, плаксива при контакте с посторонними, на фоне эмоций- нарастание мышечного тонуса.

Жалобы с рождения- беременность 3 (1;2- выкидыш и замершая) роды преждевременные- 33нед, экстренное кесарево сечение, Апгар 6-6баллов, масса 2230г, ИВЛ 4 суток. Голову начала удерживать с 3,5-4мес. Судорог не отмечалось.

Постоянно получает курсы кинезитерапии, ЛФК, от медикаментозного лечения родители воздерживаются, но провели курс баклосана. Последний курс медикаментозное лечение – в 1г 4мес.

Неврологический статус- поведение тревожное, на осмотр плачет, рефлекторные вздрагивания. Сходящееся косоглазие OS с паралитическим компонентом. Речь- фразовая, простые предложения, элементы дислалия. Мышечный тонус повышен в сгибателях ног, в руках преимущественно слева, затруднено разведение в т/б суставах. Высокие сух. Рефлексы S=>D, с пирамидными симптомами. Сидит самостоятельно.

Заключение: ДЦП, хронический резидуальный период, спастическая диплегия, средней степени тяжести.

Рекомендовано:

1. В поликлинике по м/ж-ва предоставить документы на рассмотрение МСЭ.
2. Ношение ортопедической обуви, ночных туторов, ортезов.
3. Реабилитационные курсы лечения 3-4р в год (ЛФК, массаж, кинезитерапия, медикаментозное лечение)
4. Курсы миорелаксантов, ноотропов, метаболиков, нейропептидов 3р в год.

В настоящее время- возможно проведение курса лечения:

1. Карнидетин по 1 капсуле- 2р (утро, вечер)-1мес. (капсулу можно открыть)
2. Семакс 0.1% по 2 капли-2р (утро, вечер) в каждый носовой ход-2нед.
3. Мидокалм 0,05 (5мг/кг) по 1/2т-2р (утро, вечер)-5дней, затем по 1/2т-3р в день в течение 2-3мес- с последующей постепенной отменой в течение 1-2нед.
4. Наблюдение невролога по м/ж-ва.

23.11.17г

Вр.

Сулименко О.В.

