

Нейроклиника профессора Якупова

Адрес: г. Казань ул. Достоевского д. 52
тел.: (843) 537-93-93, 537-93-37
www.klinika-zdorovya.ru
www.klinika-zdorovya.info

НЕЙРОКЛИНИКА
профессора Якупова

Мы в социальных сетях!
Наши YouTube-каналы:

профессор Эдуард Якупов

Нейроклиника профессора Якупова



О Медицине. О Науке. О Жизни. Профессионально. Доступно. Интересно.

«Если у Вас возникнут вопросы, вы можете задать их на сайте нашим докторам» <https://klinika-zdorovya.ru/>

Приём врача (осмотр, консультация)

Невролог

Гусяков Филипп Игоревич

ЭПИЛЕПТОЛОГ

Время приема: 16:23 Пациент: **Яров Самир Рамилович**

Дата: **07.06.2024** Дата рождения: **27 Февраль 2023**

Жалобы: 1 год 3 мес.
приступы
задержка развития

Анамнез заболевания: Б4, Р4, sibсы здоровы, семейный анамнез не отягощен. До 2 месяцев без острых состояний, но задержанное физическое и моторное развитие, плохой набор веса и отсутствие нормальной фиксации взора. В 2 мес дыхательные нарушения, пневмония.

Далее частые респираторные инфекции, ГЭРБ.

Задержка развития навыков: не сидит, контроль головы неуверенный, отсутствует зрительный контакт, эмоциональность снижена, не тянется, не удерживает.

Приступы спазмов, спазм-тонические? (длительные по домашнему видео), связанные с пробуждением, кластерные появились месяц назад, стал более сонливым, но без регресса навыков, мама отмечает, что, напротив, стал более улыбчивым и реагирующим.

Результаты обследования: ЭЭГ в 12 мес - модифицированная гипсаритмия во сне, преобладание замедления и разрядов спайков и полиспайков в левом полушарии
МРТ выраженный дефицит белого вещества симметрично в обоих полушариях

Объективный осмотр

Сознание ясное

Общее состояние удовлетворительное

Неврологический статус

гипотония диффузная, расходящийся страбизм, Бабинский, микроцефалия ОГ 42 см (+7 см), поперечные пальмарные линии с обеих сторон, вдавленность височных областей

Диагноз и рекомендации

Диагноз: G40.5. Особые эпилептические синдромы

эпилепсия с инфантильными спазмами. Этиология вероятно генетическая

Обследование: секвенирование экзома (лаборатория генетико, геномед). взаимодействовать с благотворительными фондами.

Лечение: вигабатрин с 250 мг вечером, через 5 дней 500 мг вечером, через 5 дней 750 мг вечером, если приступы сохраняются - через 5 дней 1000 мг вечером. Оценка в течение 2 недель. При наличии приступов госпитализация в 8 ДДБ для проведения гормональной терапии. Если приступы заканчиваются на низких дозах вигабатрина, не увеличивать.

Консультации: через месяц ЭЭГ сна и консультация

Врач

Гусяков Филипп Игоревич

Ваше мнение очень важно для нас, помогите нам стать лучше. Пожалуйста, оставьте отзыв о приеме:



О состоянии своего здоровья, диагнозе, прогнозе заболевания, результатах обследования, методах лечения информирован с предложенным объемом обследования и лечения согласен

Дата

Подпись пациента